

ชื่อ จันทราวัธ เจริญพร ตำแหน่ง ผ.สพ. วิชาสุขภาพสัตว์

10

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

- ๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ต้วม ต้วม ไล่กัดสิ่งที่ยาวหน้า ทางตกขากรรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น
- ๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง
- ๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มีระยะเวลา ๓๐ วัน
- ๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น
- ๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน ๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑)
- ๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ
- ๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมีมาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน
- ๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย
- ๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้
- ๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน

ชื่อ..... นางสาว อรุณรัตน์ ตำแหน่ง กรมสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ดุร้าย ไล่กัดสิ่งที่ยาวหน้า ทางตกร
ขากรรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น ✓
๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง ✓
๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี
ระยะเวลา ๓๐ วัน ✓
๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ✓
๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน
๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑) ✓
๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ ✓
๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี
มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน ✓
๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย ✓
๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้ ✓
๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน ✓

ชื่อ ทศวิมล อธิ ตำแหน่ง นางสาวทศวิมล อธิ

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

.....๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ดุร้าย ไล่กัดสิ่งที่ขวางหน้า หางตก
ขากรรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น ✓

.....๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง ✓

.....๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี
ระยะเวลา ๓๐ วัน ✓

.....๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ✓

.....๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน
๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑) ✓

.....๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ ✓

.....๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี
มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน ✓

.....๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย ✓

.....๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้ ✓

.....๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน ✓

ชื่อ..... พณิศา อ. ตำแหน่ง..... ร.ร. รังสิต

9

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

-๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ต้วม ต้วม ไก่กัดสิ่งที่ยาวหน้า ทางตกล
ขากรรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น ✓
-๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง ✓
-๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี
ระยะเวลา ๓๐ วัน ✓
-๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ✓
-๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน
๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑) ✓
-๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ ✓
-๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี
มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน ✓
-๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย ✓
-๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้ ✓
-๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน ✗

ชื่อ โรนดา บงษ์จันทร์ศิริพงษ์ ตำแหน่ง นางสาวสัตวแพทย์ปฎิบัติการ

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

.....๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ตู๋ร้าย ไก่กัดสิ่งที่ยาวหน้า ทางตก
ซากกรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น ✓

.....๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง ✓

.....๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี
ระยะเวลา ๓๐ วัน ✓

.....๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ✓

.....๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน
๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑) ✓

.....๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ ✓

.....๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี
มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน ✓

.....๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย ✓

.....๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้ ✓

.....๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน ✓

ชื่อ นายอรุณศักดิ์ นะโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

-๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ตูร่าย ไล่กัดสิ่งที่ยาวหน้า หางตก ขากรรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น ✓
-๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง ✓
-๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี ระยะเวลา ๓๐ วัน ✓
-๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ✓
-๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน ๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑) ✓
-๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ ✓
-๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน ✓
-๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย ✓
-๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้ ✓
-๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน ✓

ชื่อ..... ศุภชัย นักรัตน์เลิศ ตำแหน่ง..... นายสัตวแพทย์

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

..........๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ต้วม ต้วม ไก่กัดสิ่งที่ยาวหน้า ทางตก
ขากรรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น

..........๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง

..........๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี
ระยะเวลา ๓๐ วัน

..........๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น

..........๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน
๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑)

..........๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ

..........๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี
มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน

..........๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย

..........๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้

..........๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน

ชื่อ นายวิรัตน์ ชั้น: ๐๑๑ ตำแหน่ง ผู้วิทยากร

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

..........๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ต้วม ต้วน ไก่กัดสิ่งที่ยาวหน้า ทางตก
ขากรรไกรเป็น อัมพาต เท่านั้น

..........๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง

..........๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี
ระยะเวลา ๓๐ วัน

..........๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น

..........๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน
๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑)

..........๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ

..........๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี
มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน

..........๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย

..........๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้

..........๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน

ชื่อ นศ.ณัฐพร เพ่งกินท: ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานระบาด

จงทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด

-~~X~~.....๑. สุนัข เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะแสดงอาการ น้ำลายไหล ตู๋ร้าย ไส้กัตสิ่งที่ยาวหน้า ทางตก
ซากกรไรเป็น อัมพาต เท่านั้น ✓
-~~X~~.....๒. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องสอบสวนโรคภายใน ๔๘ ชั่วโมง ✓
-✓.....๓. ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประกาศ มี
ระยะเวลา ๓๐ วัน ✓
-✓.....๔. สัตว์ที่โอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ✓
-✓.....๕. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด แต่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน
๑ ปี ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น ๔ เข็ม ห่างกันครั้งละ ๔ วัน (๐ ๓ ๗ และ ๑๑) ✓
-✓.....๖. พื้นที่เสี่ยง มี ๓ ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ ✓
-✓.....๗. พื้นที่เสี่ยงสูง คือพื้นที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า รัศมีห่างจากจุดเกิดโรค ๑ กิโลเมตร ต้องมี
มาตรการฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกระตุ้นซ้ำ ๑ เดือน ✓
-✓.....๘. สุนัข ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ควรทำลาย ✓
-✓.....๙. First case ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาจมาจากสัตว์ป่าก็ได้ ✓
-✓.....๑๐. สุนัขที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักไว้ ๑๐ วัน - ๖ เดือน ✓